

Observation N^o 17

Sur un déchirement Considérable de la Matrice.

Par Mr. Le Roy Chir. à Dijon

La nommée Jeanne Sicardet, femme de Simon Simon erigueron a fontaine les Dijon, euvole en travail d'enfant le 17 mai 1762, agée de 34 ans, a eu cinq enfans pendant son mariage. Le 1.^{er} vint difficilement parcequ'il étoit mal tourné, elle eut ensuite deux filles qui se présentèrent bien et qui vivent encore.

Elle accoucha du quatrième enfant sur la fin de décembre 1777, l'accouchement fut des plus laborieux, l'enfant étoit fort gros, il se présenta par les fesses et resta 48 heures au passage. La sage femme du pays s'opiniâtroit à ne vouloir aucun secours, mais les parens inquiets du retard de l'accouchement envoyèrent chercher M. Julien Jeanne Chirurgien de Dijon qui le termina en très peu de tems.

La Compression violente et trop longue continuée que le Corps de l'enfant avoit faite dans le vagin et à l'orifice de la Matrice y produisit une inflammation gangreneuse. L'orifice de la matrice, le corps de la vessie et une partie de l'intérieur du vagin se séparèrent; l'escarre qui tomba du corps de la vessie y laissa une fistule par laquelle l'urine couloit perpétuellement dans le vagin. La suppuration fut longue ainsi que l'explication, car deux mois après l'accouchement la femme se plaignoit encore d'un gonflement périlleux et de la sortie de quelques membranes.

La Santé de cette femme est beaucoup de peine à se rétablir.

ARC 17d. 3 n^o 57



après ces couches aussi facheuses, elle fut deux années entières
sans être réglée. Dans le temps quelle devoit avoir ses regles elle
ressentoit des douleurs cruelles dans les lombes qui lui durèrent
deux ou trois jours. Après ces deux années les regles parurent
mais en très petite quantité, elle ne rendoit que quelques gouttes de sang
qui faisoient sur son linge une tache de la largeur de la paume
de la main; Cependant ce peu de sang quelle rejettoit diminua
considérablement. Ses Coliques qui devinrent moins vives et moins
fréquentes, pendant l'été elle étoit quelque fois deux mois sans en
ressentir quoiqu'elle eût ses regles dans l'intervalle.

Sur la fin de l'année 1761. Cette femme devint enceinte du
cinquième enfant. Sa grossesse l'inquiéta beaucoup, parcequ'elle se
souvenoit des maux que lui avoit causé son dernier accouchement
et quelle en craignoit encore de plus terribles de celui-ci; l'incontinence
d'urine dont elle étoit atteinte redoublait encore son frayeur; c'est
ce quelle me témoigna au mois de mars dernier lorsqu'elle vint me
prier d'avoir soin d'elle.

Le 11 mai, son mari vint me chercher à cinq heures du matin, il
me dit que sa femme avoit des douleurs depuis la veille. je partis sur
le champ et la trouvai ayant eu apparence de vrai douleur. —
je touchai cette femme et ne distinguai aucune préparation, il ne me
fut par même possible de reconnaître l'orifice de la matrice et je ne
sentir par cette rondeur que l'on remarque ordinairement lorsque la
tête appuie sur le col de ce viscère et qui est un présage ordinaire
d'un accouchement prochain; mais je trouvai l'orifice du vagin fort
dilaté, la cavité intérieure très amplifiée et un allongement de sa
paroi postérieure qui débordoit les lèvres de la vulve. Je sentir
aussi antérieurement, dans le haut du vagin, immédiatement sous
l'onguin, une ouverture, qui me parut alors, de la longueur

D'un demi pouce de devant en arrière, et de la largeur d'environ trois
doigts. Je jugeai que cette ouverture étoit la fistule que je
soupçonnai être dans le corps de la vessie, et par où les urines
passoient dans le vagin. Cette ouverture fistuleuse étoit très sensible,
car dès que je la touchois de l'extrémité du doigt, la malade se
plaignoit beaucoup et me repoussoit le bras.

Ne trouvant à cette femme aucune préparation à un accouchement
prochain, je la quittai après l'avoir fait saigner, et laissai auprès
d'elle mon élève sur lequel je pouvois compter. La distance de Dijon à
cet endroit n'étant que d'une petite demi lieue, j'y retournai l'après
midi. Les douleurs n'étoient pas si vives que le matin, je la touchai
encore et ne trouvai ~~ne trouvais~~ rien de changé. Je pensai alors que
c'étoit de fausses douleurs; cela me détermina à laisser cette femme
tranquille, je la fis coucher et recommandai que si l'on s'apercevoit que
les douleurs augmentassent on me vint chercher.

L'état de cette femme fut à peu près semblable jusqu'à la nuit
du 16 au 17 que les douleurs augmentèrent considérablement. On vint
me chercher le 17 à deux heures du matin; quelques affaires qui me
retenoient à la ville m'empêchèrent de partir sur le champ; mon
élève souffrit à aller à fontaine et me promit de m'envoyer un exprès
si quelque chose pressoit pour l'accouchement. Il fut de retour à six
heures du matin lorsque j'étois sur le point de l'aller rejoindre.
Il me rapporta que tout étoit dans le même état du côté du
vagin, c'est à dire qu'il n'y avoit aucune préparation à l'accouchement;
mais il me dit en même temps que cette femme avoit eu des douleurs de
colique terribles, et qu'après la dernière elle avoit eu une faiblesse
dans laquelle elle avoit manqué périr, qu'il l'avoit laissée un peu mieux
et qu'elle se plaignoit seulement de quelques douleurs aux environs du
nombril. Il lui avoit ordonné un lavement émollient et je lui envoyai
une potion anodine dans la vue de calmer l'irritation des intestins.



car je ne soupçonnai nullement la rupture de matrice, qui vraisemblablement étoit arrivée dans le tour de la dernière douleur vive et dont la faiblesse qui survint fut un accident consécutif. (a)

Enfin on vint de nouveau me chercher le même jour à dix heures du matin, je partis sur le champ.

je trouvai cette femme dans la plus grande faiblesse, elle n'avoit plus de pouls; la pâleur de la mort couvroit son visage, elle ne prononçoit que quelques mots par intervalle d'une voix faible et étouffée. Les douleurs utérines avoient cessé depuis le matin, celles de l'ombilic qui leur avoient succédé étoient calmées; ou si elles existoient toujours la femme n'avoit pas la force de s'en plaindre; les extrémités étoient froides et couvertes de la sueur d'évolution dont parle M. Levret (b). elle étoit couchée sur le côté gauche, je la fis tourner sur le dos pour examiner l'état du vagin et du ventre. le vagin étoit dans le même état où je l'avois trouvé quelques jours auparavant; il n'y avoit point d'écoulement de sang ni d'autres liqueurs. la fistule de la vessie avoit toujours la même sensibilité; car l'ayant touchée légèrement de l'extrémité du doigt, la femme se plaignit et fit un effort pour me repousser. le ventre étoit plus étendu et plus tuméfié qu'à l'ordinaire (c) et cependant mollet. Ce fut alors que je soupçonnai la rupture de la matrice; j'aurois fait l'opération césarienne sur le champ, mais l'extrême faiblesse de la malade me fit craindre qu'elle n'expirât entre mes mains, ce qui seroit infailliblement arrivé, car lorsque j'eus fini mon examen, elle rassembla le reste de ses forces pour se tourner sur le côté droit où elle mourut quelques minutes après, sans que je m'aperçusse quelle fût la moindre grimace, ni quelle eût la plus

(a) v. art. des accoucheurs par M. Levret, p. 106. § 600.

(b) v. le même.

(c) v. le même et la dissertation de M. Crantz, § XV.

légère convulsion.

J'attendois ce moment pour faire l'incision à l'hypogastre, je jettai auparavant un coup d'oeil sur le ventre; il étoit, comme je l'ai déjà dit, tendu uniformément depuis le pubis jusqu'au cartilage xiphoïde; en appuyant la main dessus je sentis les membres de l'enfant du côté gauche à travers les téguments, ce fut ce qui me décida à faire l'incision de ce côté; cet examen ne dura qu'un clin d'oeil.

J'ouvris les téguments communs et propres de la longueur de cinq travers de doigt; il sortit aussitôt une grande quantité de sang caillé et j'apparus une jambe de l'enfant. Je la saisi et tirai cet enfant avec la plus grande facilité. Il étoit mort, paroissant de la grandeur et de la grosseur ordinaire d'un enfant à terme; son dos étoit tourné vers le côté gauche de la mère, son ventre du côté de la matrice, dans laquelle aucune de ses parties n'étoient contenues. Le placenta étoit enco dans la cavité de ce viscére et cet organe étoit rangé du côté droit de la femme. La ténacité n'empêcha d'enlever moi-même la matrice, je le fis faire par un Souclicier mon élève, qui avoit suivi, et qui emporta avec la matrice, la vessie, partie du vagin et une portion du péricône. Je fis transporter le tout à la chambre de la communauté des chirurgiens de Dijon où il devoit y avoir une assemblée l'après-midi.

Je fis voir la pièce à mes confrères telle quelle avoit été enlevée; nous découvrirent à la matrice un déchirement considérable qui commençoit sur le côté gauche et un peu antérieur de son fond, se continuoit le long de la partie latérale gauche, passoit sous l'ovaire, la trompe de fallope, le ligament large du même côté et finissoit à un pouce de distance de l'endroit où étoit l'orifice que nous avions par enco découvert. Le déchirement étoit si considérable, que quelqu'un, qui n'avoit sûrement pas fait attention que toute la circonférence supérieure du vagin étoit avec la pièce et étoit conservée intacte.



décida que l'orifice étoit compris dans le déchirement. Je n'étois
pas de cet avis, je le croyois totalement clos; cependant à force de
chercher je découvris une petite ouverture du côté du vagin, à une ligne
de distance de la fistule de la vessie. je le fis remarquer à M^r. Moir,
nous y introduisîmes une sonde qui pénétra aisément dans la cavité
de la matrice et nous prouva que c'étoit vraiment l'orifice de ce
viscère. Nous passâmes ensuite à l'examen de la vessie, qui étoit d'un
très petit volume; son corps étoit ouvert à sa partie inférieure et
postérieure par une fistule très considérable, en égard au volume
de cet organe; nous ne pûmes pas plus loin nous rechercher,
parceque le tumeur ne nous le permit pas.

De retour chez moi j'examinai de nouveau la pièce, avec le plus
d'exactitude qu'il me fut possible; voici ce que j'y ai observé.

Le volume de la matrice est très considérable, son poids est de
deux livres deux onces; sa circonférence horizontale, en la
supposant dans le Cadavre et la femme debout a 14 pouces; la
verticale qui embrasse la face antérieure et la postérieure a 19 pouces
6 lignes; la verticale et latérale a 19 pouces 7 lignes. La face
antérieure est plus convexe que la postérieure; la première a 7 pouces
9 lignes depuis le milieu du fond jusqu'à l'orifice; mais elle n'a que
6 pouces 8 lignes de largeur ou diamètre; sous le milieu des parties
latérales de cette face se trouvent les ligaments ronds et larges,
les trompes et les ovaires qui sont dans leur état naturel. La
face postérieure a 7 pouces 9 lignes du fond jusqu'à l'orifice, et
7 pouces quatre lignes de largeur. on ne remarque rien de
particulier à cette face.

Le déchirement est situé sous la ligne verticale et latérale gauche,
il la quitte un peu vers le fond et se recourbe sous la face
antérieure. Si l'on tire une ligne droite qui traverse la cavité de
la matrice d'un angle du déchirement à l'autre, elle sera

longue de 6 ponce. La ligne courbe tirée sur la terre ~~postérieure~~
antérieure de la playe aura 8 ponce; la même ligne tirée sur la
terre postérieure aura 9 ponce 6 lignes. La terre antérieure
paroit lailée en biseau dans toute l'épaisseur de la matrice; sur le
milieu de la partie antérieure de cette terre on remarque l'ovaire
qui est immédiatement sur le bord du déchirement. La terre
postérieure est faite singulièrement, toutes les fibres paroissent s'être
rassemblées pour former un boudet arrondi très épais du côté de
la cavité de la matrice, qui a 10 lignes et demie d'épaisseur; de
ce boudet se sépare une portion de la matrice recouverte extérieurement
du péritoine, qui n'a guère qu'une ligne et demie d'épaisseur: cette
portion a 11 lignes de hauteur dans le milieu; elle va en pointe en
diminuant irrégulièrement d'espandre jusqu'àupres du col, où les fibres
propres de la matrice manquent et où il ne reste que le péritoine tout
aud, qui paroit s'être déchiré le dernier. Dans le tiers supérieur du
déchirement, cette portion allongée de la matrice manque, le boudet
au contraire se continue en diminuant d'épaisseur jusqu'à l'angle
supérieur du déchirement, et dans cet endroit la matrice s'est déchirée
sur le bord postérieur du boudet sans avoir laissé d'allongement comme
ailleurs. La portion qui se sépare du boudet paroit avoir conservé la
vraie épaisseur qu'avoit la matrice de ce côté là avant le déchirement;
au lieu que le boudet n'est formé que par la rétraction des fibres propres
de la matrice après la sortie de l'enfant; celles cy avoient conservé leur
essor les autres l'avoient perdu.

La cavité intérieure de la matrice a aussi beaucoup d'étendue, elle a
6 ponce 3 lignes en tirant une ligne droite depuis le fond jusqu'à
l'orifice, et 4 ponce 7 lignes de diamètre depuis le milieu du côté droit
jusqu'au bord du déchirement. Le placenta occupoit le côté droit de la
cavité de ce visère, on distingue facilement l'endroit où il étoit



implanté, parceque cet endroit est d'un rouge plus vermeil
plus clair que le reste; on y remarque même plusieurs orifices
veineux d'intervalle a autre, qui paroissent avoir été adaptés
a de pareils du placenta. Ce qui reste de la cavité ou le placenta
n'estoit par attaché est d'un rouge plus obscur, on n'y remarque
point d'orifice veineux.

L'orifice de la matrice n'avoit guere qu'une ligne de diametre
quand la piece étoit fraîche, il s'est relâché par la macération et
il a actuellement deux lignes. il paroît formé par une membrane
blanchâtre qui a beaucoup de ressemblance avec la peau des cicatrices.
cette membrane est environnée de plusieurs petites brides de la
même nature; il y en a une, entre autres, du côté interne de la
matrice qui est plus considérable que les autres. Cette membrane dont
l'orifice est formé et les petites brides qui l'environnent n'ont pu
résister et s'étendre lors des contractions uterines, ce qui, aidé de la
mauvaise situation de l'enfant a dû être la cause du déchirement
de la matrice.

L'épaisseur de cette matrice n'est pas la même par tout; le fond
et l'orifice sont les endroits les plus minces. le fond n'a que
3 lignes d'épaisseur dans le milieu, et qu'atres lignes sur le côté du
fond ou finit le déchirement. L'orifice n'a guere qu'une ligne à
deux lignes de distance du bord circulaire, ce bord n'a par un quart
de ligne d'épaisseur; il y a environ 12 lignes de cet endroit a l'angle
inférieur du déchirement. A environ deux doigts de l'orifice du côté
droit il y a 4 lignes d'épaisseur. le milieu du côté droit a environ
douze lignes, il va en diminuant circulairement jusqu'au bord de
l'attache du placenta, excepté dans l'endroit ou voit le ligament
rouge ou il y a 13 lignes; ensuite depuis le bord du placenta jusqu'au
déchirement l'épaisseur augmente un peu. il y a 14 lignes a la

racine du ligament rond gauche, 12 lignes à la face postérieure à 9 -
lignes du boutlet dont j'ai parlé; le boutlet n'a que 10 lignes et demie.
Le milieu de la face postérieure a aussi 12 lignes sur la ligne verticale.

La vessie est fort petite et fort rétrécie, on en sent la raison; elle n'a que
21 ligne de longueur du fond jusqu'au col, et 16 lignes ou à peu près de
diamètre. Son épaisseur est d'une ligne; la membrane interne est remplie de
brides transversales. La fistule qui est à la partie postérieure est fort grande
relativement au corps de cette partie, puisqu'elle a 12 lignes de devant en
arrière et six lignes de largeur, elle ne paroît avoir qu'environ 3 lignes
de largeur quand la femme étoit vivante. On remarque intérieurement autour
de cette fistule trois ouvertures; l'une située à la partie antérieure et
inférieure et les deux autres sur les parties latérales. L'ouverture antérieure
et inférieure est à quatre lignes du bord de la fistule, c'est l'orifice interne
du canal de l'urètre; les deux autres sont bien petites, elles sont situées
de chaque côté à environ trois lignes de la fistule, ce sont les orifices des urètres.
La membrane interne de la vessie s'est cicatrisée sur le bord de la fistule avec
la membrane interne du vagin.

La portion du vagin qui a été enlevée avec la pièce a 17 lignes de
longueur sur 2 pouces de diamètre; la membrane interne est ridée sur le
bord de la section, mais toute la circonférence du fond de l'étendue de 8 lignes
est lisse et unie. On remarque dans le milieu du fond du vagin deux ouvertures,
l'une antérieure et l'autre postérieure. L'antérieure est fort grande, c'est la
fistule de la vessie. La postérieure est beaucoup plus petite, elle n'est séparée
de l'antérieure que par une membrane assez mince; c'est l'orifice de la matrice
qui est entourée, du côté du vagin, comme du côté de la matrice de plusieurs
petites brides. Immédiatement au dessus de cet orifice on remarque à la paroi
postérieure du vagin, une cicatrice de la largeur et à peu près de la figure
de l'ongle du pouce; elle a 4 lignes d'étendue depuis l'orifice de la matrice,
jusqu'à l'endroit où elle finit dans le vagin, et six lignes de largeur. Sur
cette cicatrice se trouve une petite tumeur molle et irrégulière, qui a deux



liquor de hauteur Sur trois des Base.

La portion du péritoine est située entre le fond de la vessie et le col de la matrice ; c'est la partie de cette membrane qui ayant recouvert l'utérus, se réfléchit Sur le fond de la vessie, ou elle ne s'attache que par son tissu cellulaire, et vient gagner les muscles du bas ventre pour les tapisser à leur tour. Cette portion du péritoine a 4 pouces de hauteur Sur 6. de largeur.

Sur les parties latérales et inférieures, tant du col de la matrice que de celui de la vessie, on remarque une portion tronquée des vaisseaux sanguins de ces visceres, de même qu'une partie des ureteres.

Réflexion Sur cette Observation.

J'ai divisé en trois parties les réflexions que ma fait naître cette observation. Dans la première après avoir jetté un coup d'œil Sur l'état de la matrice en question et Sur la structure de ce viscere en général, j'expose quelques conjectures qui meont paru vraisemblables Sur le mécanisme des contractions uterines. Dans la seconde je traite des causes qui ont produit la rupture ; et dans la troisième j'examine les ressources qu'on auroit pu employer pour sauver la mere et l'enfant.

Première partie.

L'épaisseur considérable et la rougeur de la matrice qui fait le sujet de mon observation ont fait croire à quelques uns de mes confreres qu'elle étoit dans un état inflammatoire ; mais je crois qu'elle auroit été dans l'état le plus naturel s'il n'y avoit point eu de déchirement. immédiatement après la sortie de l'enfant la matrice se contracte, se resserre, ses parois se rapprochent, rentrent, pour ainsi

Dire, en elle même, et doivent par cette raison augmenter d'épaisseur. La rougeur n'indique par elle l'inflammation; la matrice est composée de fibres charnues entourées d'une grande quantité de vaisseaux sanguins; les fibres charnues sont communément rouges à cause de ces vaisseaux, par conséquent la matrice ne doit par avoir une autre couleur, et cette couleur doit être bien plus foncée, dans toutes les matrices, peu de temps après l'accouchement, parceque les vaisseaux sont toujours dans ce cas remplis de beaucoup de sang dont une partie doit rentrer dans la masse ^{générale} tandis que l'autre fournira la matière des lochies.

L'épaisseur des fibres charnues de la matrice n'est plus un problème; ce qui a donné lieu de douter de leur réalité, c'est que la chair de ce viscère est dans l'état naturel d'un rouge plus pâle que celui des autres muscles (1.) et que la direction des fibres y est si variée par leur entrelacement qu'il est très difficile de la suivre. mais le propre des fibres charnues n'est point d'être rouges, cette couleur n'est qu'un masque fourni par la quantité de vaisseaux sanguins qui les entourent ou les accompagnent, cela est si vrai qu'on peut les dépouiller de cette couleur par différentes lotions.

Ce qui distingue donc essentiellement la fibre charnue des autres fibres, c'est le mouvement de contraction dont elle est susceptible; ainsi par tout où il y aura du mouvement, que les fibres qui l'exécutent soient rouges ou blanches ce seront toujours des fibres charnues. M. Levret avoit prouvé la première édition de son art des accoucheurs et de développer l'arrangement des fibres de la matrice et de rendre raison de leur action, il seroit à souhaiter que ce célèbre auteur exécutât sa promesse. (2.)

La matrice étant donc reconnue musculeuse ou sentivement unanime ou plus grand nombre des auteurs, elle ne peut se contracter sans avoir un point fixe et un point mobile. Suivant la loi générale c'est le

(1.) v. traité de la théorie et pratique des accoucheurs traduit de l'anglais de M. Smellie, volume, p. 96. cet auteur est du nombre de ceux qui doutent de l'existence des fibres charnues de la matrice.

(2.) voyez première édition de l'art des accoucheurs de M. Levret, page 24, paragraphe 160.

corps du muscle qui se contracte, le point fixe reste dans la situation et le point mobile est entraîné. voyez si l'on ne peut pas faire à la matrice l'application de ce principe incontestable.

Je crois qu'on peut regarder comme le point fixe de la matrice son attache aux parties postérieures des régions iliaques par le moyen des ligaments larges et au pubis par celui des ligaments ronds: l'endroit le plus épais des parois de ce viscére, celui où ses fibres seront en plus grand nombre et plus fortes, sera le corps du muscle et le centre de la contraction; l'orifice de la matrice et les parois de ce viscére qui seront plus faibles et plus minces seront les points mobiles. il ne faut pas être étonné que les ligaments de la matrice résistent malgré leur faiblesse apparente à la violence des contractions; ils sont soulagés par la contraction des muscles du bas ventre et par l'abaissement du diaphragme qui appuient toujours sur l'utérus quand les douleurs sont d'une certaine vivacité, de sorte qu'ils ne peuvent jamais se déchirer, et si cela étoit arrivé quelque fois, comme quelques auteurs le prétendent (3.) cela viendrait encore à l'appui de mon sentiment.

Le muscle que Ruysch prétend avoir découvert dans le fond de la matrice sembleroit indiquer que c'est là le centre de la contraction; mais ce muscle n'existe point spécialement dans le fond de ~~la matrice~~ ce viscére (4.), il est répandu également dans toute son étendue, sans que le centre se trouve fixé plutôt dans un endroit que dans un autre; d'ailleurs le fond de la matrice pèche et s'étend dans la grossesse plus que tout le reste et se dilate souvent considérablement: ce n'est

(3.) voyez la dissertation de M. Chaulz insérée à la suite des accouchemens de M. puison, 8X.

(4.) les fibres en tourbillon que cet auteur prétend y avoir vu ne sont pas les seules qui aient cette direction; M. Leuret dans son leçon particulière nous a dit qu'il en avoit vu de semblables à l'orifice des trompes, qui s'étendent même fort avant sur le corps de ce viscére et sur le fond où elle paroissent se croiser; ne seroit-ce pas là ce qui en a imposé à Ruysch. M. Leuret insinue quelque chose de cette structure dans son traité sur l'art des accouchemens, édition de 1761. p. 34. § 209.

Donc plus lui qui doit être regardé comme le centre de la contraction, il faut le chercher ailleurs, et on le trouvera dans le lieu où s'attache le placenta. (5.).

que l'endroit où s'attache le placenta soit le vrai centre de contraction utérine, c'est ce qui paroit prouvé par l'inspection anatomique de la matrice que j'ai démontrée; *ibid.* Levet a entrevu cette vérité, (voyez la note 4) mais il ne lui a pas donné l'extension qu'elle mérite.

Pour concevoir le Système que je vais développer, il faut se rappeler quelques principes reconnus de presque tous les auteurs. Le 1.^{er} est que la matrice se dilate progressivement et inégalement pendant la grossesse; c'est à dire, que le lieu de l'attache du délivre ne se dilate pas dans la même proportion que le reste des parois de ce viscére, mais qu'il ne s'étend que relativement à l'accroissement du placenta (6.); voilà donc une raison pour que les fibres y soient plus nombreuses et par conséquent plus fortes. Le 2.^o que le placenta tient toujours plus ou moins à l'orifice d'une des trompes, suivant le sentiment de Fallope; et qu'il est fort rare qu'il s'attache positivement au fond de la matrice; comme il est excessivement rare qu'il s'attache sur l'orifice. Le 3.^o que l'avouchement ne se fait que parceque la Matrice par sa contraction se rapproche sur elle même; mais pour que la Matrice se rapproche sur elle même, il faut qu'il y ait un centre. D'où partent les contractions et que ce centre soit voisin d'un point d'appui. Le 4.^o que l'on peut regarder comme principe fondamental, quoiqu'il ne soit pas reconnu universellement, est que l'endroit où le placenta s'implante est celui qui s'épaissit le moins dans les contractions utérines relativement aux autres endroits.

(5.) . . . » il doit donc arriver que le centre de la route de la matrice ne peut plus se trouver dans le milieu du fond de ce viscére, mais qu'il est penché du côté où le placenta a pris racine.

4. Suite des observations de *ibid.* Levet page 108. ligne 4.^o

(6.) . . . » il en doit résulter de toute nécessité que le lieu du fond de la matrice où se trouve attaché le placenta, ne peut s'étendre autant que les autres endroits de ce même fond ou le placenta n'a point d'adhérence. *ibid.* page 107. ligne dernière.

De ces quatre propositions se déduit naturellement et facilement le mécanisme de l'accouchement. je n'entreterai pas dans le détail de la première cause qui produit les contractions, je développerai seulement mon sentiment sur le siège ou centre des contractions utérines.

L'endroit où le placenta s'implante conservant donc le plus d'épaisseur dans la dilatation passive de la matrice, semble être une ressource ménagée exprès par la nature pour la contraction; aussi dès que le mouvement passif cesse, ces fibres musculaires plus fortes se contractent, et comme toutes les fibres de la matrice sont enchaînées ensemble, elles tirent les plus voisines et réveillent leur ressort; ainsi de proche en proche, toutes celles qui sont hors de l'attache du placenta se mettent en contraction et tendent à se rapprocher du centre. Dans le commencement ces contractions sont à peine sensibles à cause de la faiblesse des fibres; mais peu à peu elles acquièrent de la force, parceque n'ayant par la même continuité à l'orifice et l'enchaînement y étant interrompu sur l'espèce de sphincter qui le forme, celui-ci est obligé de prêter: si peu qu'il s'écarte les membranes s'y introduisent et le dilatent davantage en le comprimant circulairement de dedans ou dehors; les fibres de la matrice qui par ce moyen se trouvent rapprochées un peu les unes des autres, deviennent d'autant plus fortes, se contractent plus vivement, sont entraînées davantage par le gonflement de celles où s'attache le docteur; celles-ci qui ont leur point d'appui sur le ligament de la matrice le plus voisin, le tiraillent et produisent la première douleur (7). Ce tirailllement est occasionné parceque la matrice dans sa contraction se redresse, se porte un peu en devant et en haut: le point d'appui solide que sa partie inférieure rencontre sur le cercle supérieur du petit bassin

(7) M. Semola pense que les douleurs de reins sont produites par le tirailllement des ligaments, 4. t. 1. p. 118.

l'oblige a prendre cette direction et a se jeter du côté ou il y a moins de
résistance. Chaque douleur augmente la dilatation de l'orifice, raccourcit
les fibres charnues, leur donne plus de force, les rapproche de plus en plus
du centre, mais ce centre ne se rétrécit pas autant à proportion; il y
a un corps d'une certaine solidité qui l'ayant empêché de s'étendre
l'empêche aussi de se resserrer; le placenta reste donc en place jusqu'à ce que
l'enfant soit hors de la matrice; alors la paroi de ce viscére opposée
à celle de l'attache du placenta ayant acquis assez de force devient à
son tour le centre de la contraction pour expulser le délivre. Si le placenta
est médiocrement adhérent il se détachera facilement à la première
contraction qui suivra l' sortie de l'enfant; mais si les bords mammaires
sont enfoncés profondément dans la substance de la matrice, les
contractions qui a alors son centre du côté opposé, comme je viens de le
dire, tirera circulairement sur l'attache du délivre, les bords de
cet endroit qui sont devenus plus foibles céderont, se rapprocheront
et enfonceront le corps étranger dans une espèce de loge; voilà
le placenta enkisté.

pour se convaincre que ce raisonnement n'est pas entièrement dénué
de preuves, il n'y a qu'à jeter un coup d'oeil sur les différentes épaisseurs que
j'ai trouvées à la matrice. Le Placenta s'y attache à la partie latérale
droite, à peu près sur l'orifice d'une des trompes; cet endroit avoit
13 lignes d'épaisseur; c'étoit donc là le centre de la contraction ~~cette~~
dans le temps des douleurs pour l'avouchement? cette épaisseur diminue
un peu jusque sur le bord de l'endroit où finissoit l'attache du placenta;
mais dans la plénitude de la matrice quoique tel endroit n'est pas à
beaucoup près l'épaisseur que l'on y remarque actuellement, il en conserveroit
toujours plus que le reste des parois de ce viscére qui doivent être fort minces
dans ce temps (8.) après la rupture celles cy se sont épaissies, se sont

(8.) Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que la matrice se dilate également par tout;



rassemblées circulairement autour de l'attache du placenta, y ont formé un boudin, parceque les fibres ont été entraînées par la continuité de la contraction. La trompe gauche qui est du côté du déchirement a acquis 14 lignes d'épaisseur, elle s'est donc resserrée considérablement relativement à celle où le placenta s'attachoit et étoit déjà devenue son analogue pour expulser le délivre qui ne tenoit plus à la matrice que par une simple apposition.

Non seulement l'attache du placenta détermine l'inclinaison de la matrice, comme M. Desret l'a prouvé (9), et le centre des contractions utérines comme je viens de le faire voir; il fixe encore en quelque façon le siège des douleurs. La plupart des auteurs croient que les douleurs de l'accouchement ont leur siège principal à l'orifice de la matrice, et qu'elles ne se font sentir aux reins que par une espèce de sympathie, ou à cause que c'est là l'origine des nerfs; mais si cela étoit absolument vrai, les douleurs devroient toujours être les mêmes; cependant il y a des femmes qui ressentent des douleurs de reins fort vives, d'autres qui ne se plaignent que de douleurs de ventre; d'où vient cette variation? je pense qu'elle est produite par les différentes attaches du placenta. Si le placenta est implanté au côté du fond de la matrice, comme c'est appz l'ordinaire, le centre de la contraction sera voisin d'un des ligamens larges qui sera tiraille' d'un côté la douleur de reins; Si au contraire le placenta s'attache plus antérieurement, le centre de la contraction étant alors trop éloigné du point d'appui, les fibres de la matrice feront un effort plus considérable qui excitera d'autr elle-même un sentiment douloureux. Voilà la source la plus

et que le lieu où s'attache le placenta n'est pas plus épais, dans tous les cas de la grossesse que le reste des parois de ce viscére. Ce sentiment n'est pas appuyé sur un assez grand nombre d'observations pour acquiescer un degré de probabilité capable d'en imposer. Les exemples de rupture de matrice dans le lieu même de l'attache du délivre ne prouvent rien non plus contre l'opinion que j'ai adoptée, parceque dans ces cas la matrice ne peut être ravagée par le mécanisme des contractions, mais par un coup porté avec un membre de l'enfant qui étoit en convulsion.

(9.) v. suite des ob. de M. Desret, à l'article du Système de devoules combattu, page 92.

ordinaire des douleurs de ventre, qui peuvent cependant encore être occasionnées par la compression de la matrice entre le pubis et la tête de l'enfant.

Je ne prétend pas, pour cela, ôter toute sensibilité à l'orifice, mais il est assez singulier de penser que ce soit là le siège principal des douleurs (10.). Si je me blesse à l'extrémité du doigt je sens la douleur la plus vive dans le lieu même de la blessure; de même si l'on pince l'orifice de la matrice, la femme ne se plaint pas de reins s'il n'y a pas actuellement de contraction, elle souffre une douleur dans le lieu même du pincement, et si la douleur de reins survient, ce n'est que parceque le pincement excite la contraction. Mon observation vient encore à l'appui de mon sentiment. Sur le siège des douleurs; la femme qui en fait le sujet avoit des douleurs de reins et l'orifice membraneux et par conséquent impossible n'étoit ni comprimé, ni dilaté. Si le placenta s'attache sur l'orifice de la matrice, les douleurs ne seront pas si vives, parceque le centre de la contraction sera au dessus de l'insertion des ligaments aux parties offusées, ces ligaments seront par conséquent moins tiraillés. Dans les femmes qui font le sujet des observations rapportées par M. Levret dans son ouvrage sur les placenta attachés sur l'orifice de la Matrice (11.), il n'y avoit que de très petites douleurs; dans quelques unes même, il n'y en avoit point du tout, quoique dans toutes l'orifice fut dilaté.

Seconde Partie.



Trois causes principales ont concouru à la rupture de la Matrice que j'ai décrite. La 1^{re} est la structure vicieuse de l'orifice; La 2^{de} l'attache latérale du placenta; la 3^{de} la mauvaise situation de l'enfant.

Examinons la première cause, qui est l'effacelle, de son origine.

(10.) on rencontre souvent des femmes où l'orifice de la Matrice est très dilaté, flaccide et mollet, la tête de l'enfant n'appuie par dessus, elle est arrêtée dans la cavité supérieure du bassin; cependant ces femmes ont des douleurs fort vives; ces douleurs ont donc pour leur siège à l'orifice.

(11.) v. la suite des observations de M. Levret, page 48.

La structure vicieuse de l'orifice n'est point naturelle, elle a été le produit du travail laborieux des quatrièmes couches; l'expulsion qui a suivi l'inflammation gangréneuse des parties intérieures s'est faite principalement dans l'intérieur du col de la matrice et de son orifice, la cicatrice qui s'est ensuite formée en a raffermi les fibres, leur a donné plus de solidité, a même produit presque l'entière occlusion de l'orifice. il ne faut plus être étonné. Si la femme a été près de deux ans sans être réglée, si elle a ressenti des douleurs de colique si vives, et si elle a été longtemps d'une mauvaise santé. Le sang abondoit toujours à la matrice dans le tems ordinaire, elle se contractoit pour l'expulser, d'où naissent les événements de reins; ce sang ne pouvant s'évacuer, parce que l'orifice étoit bouché, refluoit dans la masse ~~du~~ générale et troubloit l'économie animale. enfin par la force des contractions utérines qui venoient de moins en moins, l'orifice se dilata un peu, il coula une petite quantité de sang, ce qui a suffi pour soulager la femme de ses coliques, rétablir sa santé et permettre à l'enfante d'entrer dans la matrice pour la conception. pendant la grossesse la matrice s'est dilatée par le fœtus comme à l'ordinaire, il paroît que le col a un peu pûlé dans les derniers tems, mais pas autant qu'il auroit dû le faire, et lors des contractions utérines au tems de l'accouchement, l'orifice qui n'étoit qu'une cicatrice, même il est vrai, n'a pu se dilater. Ce n'auroit cependant pas été un obstacle invincible si d'autres causes n'avoient pas concouru avec celle cy (12.).

(12.) en effet si le placenta avoit été attaché dans le fond de la matrice, les vaisseaux de ce viscére auroient eu par tout la même force, la tête de l'enfant qui n'auroit pas été déviée auroit appuyé sur l'orifice, l'auroit dilaté peu à peu, et l'accouchement auroit pu avoir lieu par les voyes ordinaires. M. Simon dans ses recherches sur l'opération césarienne rapporte une observation qui lui a été communiquée par un de ses confrères. La femme qui en fut le sujet accoucha après sept jours de travail, malgré un ulcère cancéreux au col de la matrice qui rendoit l'orifice très dur et très étroit. la même cite encore une observation du docteur Simpson qui fit plusieurs incisions à un orifice de matrice dur et cartilagineux, et qui procura par ce moyen l'accouchement. 4. mémoires de l'académie R. de chirurgie, in 12. t. 4. p. 337.

La 2^e Cause, qui est l'attache latérale du placenta, a produit la dilatation inégale de la matrice et sa déviation; l'endroit qui lui étoit diamétralement opposé a été obligé de prêter et de suppléer au défaut du col (13.); par ce moyen l'équilibre des forces de la matrice a été rompu, et les douleurs ont porté tout l'effort sur l'endroit le plus faible.

La 3^e Cause de la rupture de la matrice qui est la mauvaise situation de l'enfant, est la suite des deux premières. L'attache latérale du placenta a produit l'extension inégale du paroi de la matrice et sa déviation, comme je viens de le dire (14.); le peu de dilatation de son col a présenté un plan incliné qui a aidé à dévier la tête de l'enfant du côté gauche, qui par son extrême extension formoit un espèce de cul de sac; qu'est-il arrivé de là? que l'orifice de la matrice cicatrice s'est trouvé plus fort que la paroi latérale gauche de cet organe, que les contractions utérines qui avoient pour centre la paroi latérale droite qui étoit la plus épaisse, la plus fournie de fibres, puis que le placenta s'y attachoit, ont appuyé la tête et même le corps de l'enfant contre l'endroit le plus faible qui étoit le côté gauche, que cet endroit plus faible s'est évincé de plus en plus, et qu'enfin dans une forte contraction utérine il a éclaté tout d'un coup dans toute sa longueur.

On ne peut pas dire que les convulsions de l'enfant, que les auteurs regardent comme une des principales causes de la rupture de la matrice, aient contribué au déchirement de celle-ci; car pour que l'enfant ait des convulsions il faut que sa tête soit engagée et comprimée dans l'orifice et dans le détroit des os du bassin, sans cela il n'aura point de mouvement convulsif. Dans les cas où cette cause a existé, la matrice n'a jamais été rompue que dans un point, souvent dans son fond, et on n'a jamais

(13.).. Si au contraire le placenta s'est attaché dans une des parties latérales de la matrice, il est alors la paroi de ce visère qui lui est diamétralement opposée qui souffre le déchirement, dans cette occurrence le placenta est entier. V. art. des acc. de M. Levret page 107. §. 603.

(14.) Lorsque l'attache du placenta est bien latérale, la déviation de la Matrice est considérable, l'enfant qui est couché sur le dos ne présente pas la vertex à l'orifice, il présente une des parties latérales de la tête. M. Levret a très bien traité ce sujet, voyez la suite des observations p. 69. il y cite des observations fort intéressantes.



trouvé l'enfant flottant dans le ventre (15.)

il y a beaucoup d'exemples de déchirement de matrice, mais je ne sçais pas s'il y en a d'aussi considérables que celui que j'ai rapporté, ~~il~~
~~devient être prodigieux~~ Les observateurs que j'ai consulté à ce sujet, citent des cas où la matrice s'est trouvée fendue sur le côté, et où l'enfant nageoit dans le ventre en tout ou en partie; mais ces observations manquent de détails suffisants pour faire juger de ces ruptures; elles diffèrent de la mienne en ce que dans presque toutes l'orifice étoit dilaté, souvent compris dans le déchirement et il y avoit perte de sang par le vagin.

Troisième Partie

L'opération périlleuse proposée pour prévenir la rupture de la matrice auroit-elle pu réussir dans ce cas, et auroit-elle réussi? je ne doute nullement que par son moyen on n'eût pu au moins sauver la vie de l'enfant; mais pour s'engager à la faire il auroit fallu qu'il eût été possible de s'opposer de l'impossibilité absolue de l'anouchement par les voyes ordinaires, et c'est ce dont on ne pouvoit avoir une certitude parfaite, 1° parceque les détroits du bassin auroient pu la recevoir nécessaire pour permettre le libre passage à la tête de l'enfant (16.). 2° parcequ'il n'étoit pas possible de découvrir la structure vicieuse de l'orifice et que quand on l'auroit reconnue ce n'auroit pas été une raison suffisante (voyez la note 12.); 3° parceque les douleurs qui n'étoient pas d'une grande viracité pouvoient en

(15.) Entre toutes les observations de déchirement de matrice produites par cette cause, voici en cete une bien intéressante par l'événement qu'il tient de Ruingius. La femme qui en fait le sujet accoucha par les voyes ordinaires, Ruingius introduisit la main dans la matrice où il trouva une ouverture à travers laquelle il sentit les intestins, il tint la main dans ce viscere jusqu'à ce que l'ouverture se fut assez resserrée, et la malade guérit. v. inst. chi. part. 2, p. 728.

(16.) « l'empêchement invincible de l'anouchement dépend essentiellement de l'étroitesse extrême de la cavité du bassin. v. art. des ai. de M. Savart 864, p. 116 et suivans.

imposé pour de fausses douleurs.

S'il y a des cas où il est aisé de distinguer le vrai travail du faux, il y en a d'autres, aussi, où il est très difficile de s'en assurer, les apparences étant les mêmes. Il n'y a que le toucher qui puisse nous éclaircir encore. Souvent est-il trompeur. La marque, suivant les auteurs, à laquelle on reconnoît au toucher le vrai travail dans le commencement du travail est la dilatation de l'orifice accompagné de la tension des membranes; mais les fausses l'orifice peut être dilaté, mais on ne remarque point de tension dans les membranes (17.); cependant cette flaccidité des membranes se rencontre aussi quelque fois dans le commencement d'un vrai travail, il est vrai que les choses ne restent pas long temps en cet état. Mais lorsque l'orifice est porté postérieurement, qu'il est fort élevé et hors de la portée du doigt, il n'est point si facile de distinguer le faux travail du vrai. Quoique l'orifice de la matrice fut à jeune Sicardet bien peu éloigné de la fistule de la vessie, il ne me fut cependant pas possible de le distinguer, il n'y avait ni dureté, ni callosité sensible, la cicatrice qui le formoit étoit aussi dure que le reste des parois du vagin, le vagin lui-même qui étoit fort amplifié formoit un cul de sac à la paroi postérieure et supérieure au fond duquel mon doigt ne pouvoit pas atteindre. La tête de l'enfant qui s'appuyoit point sur le col de la matrice ne lui faisoit point faire de saillie, ajoutez encore le peu de vivacité des douleurs. On voit par cet exposé que je pouvois soupçonner l'orifice de la matrice porté postérieurement et que tout au'en imposoit pour de fausses douleurs, et je crois que quand il est question de faire une opération.

(17.) en voici des exemples. Je fus appelé il y a quelques années chez la nommée Bonnat caroleux de demeurant derrière les Capucins pour accoucher une pauvre femme qui avoit notifié chez lui par communication. Cette femme étoit dans le commencement de son neuvième mois, elle avoit des douleurs de reins fort vives accompagnées d'épistaxis. Je la touchai et trouvai l'orifice de la matrice dilaté de la largeur d'un écu de trois livres. Les membranes étoient flaccides et se sentoient à travers la tête de l'enfant; ces douleurs durèrent pendant trois jours avec la même vivacité, enfin elles cessèrent et le vrai travail ne se établit que plus de six jours après. Au mois de juillet dernier la nommée du nom de femme d'un vigneron rue de griffon succéda à celle-ci, elle avoit des douleurs vives accompagnées d'épistaxis, mon élève qu'elle avoit prié de l'accoucher fut surpris de sentir à travers l'orifice et les membranes un pied de l'enfant; il me fit avertir et je reconnus ce qu'il lui avoit annoncé, mais malgré la violence des douleurs et l'irritation de l'orifice qui se contractoit je décidai que cette femme s'accoucherait par, parce que quoique ces douleurs subsistassent depuis près de deux jours je trouvais les

membranes



aussi grave que la césarienne ou la vie court au très grand risque il ne faut pas avoir la plus légère espèce de doute sur la nécessité sans quoi on seroit criminel de l'entreprendre (18.).

Ce n'est donc qu'immédiatement après la rupture qu'on eut pu se décider à faire l'opération, et puisque la femme étoit perdue ou l'abandonnant, étoit le seul moyen qui pouvoit lui donner quelque espérance de salut et de presque certaines pour la conservation de son fruit; mais je ne me suis pas trouvé auprès de la malade dans ce moment précieux, je n'ai pu m'y transporter que huit heures après, alors son état étoit désespéré et il ne m'est resté d'autres ressources que d'attendre son dernier soupir.

Ce qui m'a fait encore présumer que l'opération césarienne, faite dans ce temps, auroit pu réussir, c'est qu'il n'y avoit aucun gros vaisseau d'ouvert, que le sang qui étoit répandu dans le ventre avoit été fourni, presque en totalité par les vaisseaux de l'intérieur de la matrice qui communiquoient à ceux du placenta dans le lieu où ce corps étoit décollé, et que la femme a survécu plus de huit heures à cet accident. L'extraction du placenta auroit donné lieu à la matrice de se resserrer et d'oblitérer les vaisseaux qui fournissoient le sang, au lieu que par sa présence il a été un corps étranger qui a tenu ces vaisseaux ouverts et a favorisé l'effusion totale du sang dans le ventre. La cure auroit sûrement été longue et difficile, la plaie

membranes flasques. elle trouva pendant la nuit dans une espèce de léthargie dont elle s'étoit réveillée que par les douleurs, ses dents étoient serrées et il y avoit convulsion aux muscles de la mâchoire, ces accidents durèrent environ 24 heures après quoi la santé se rétablit. ces réflexions ont été écrites sur la fin de septembre 1762 et la femme est accouchée le 9 octobre d'un garçon qui s'est présenté par la tête.

(18.) Je ne crois pas qu'il y ait autant de cas qui obligent à en venir à l'opération césarienne que le pense M. Crault. M^{rs} Simon et Levret les ont restreint à deux seulement qui sont l'étranglement des os du bassin et les conceptions ventrales * ils ont cité des observations qui prouvent que la nature aidée de l'art a surmonté tous les autres obstacles. M. Crault ** outre ces causes, et d'autres adoptées par les auteurs, en


* v. rechercher sur l'opération césarienne par M. Simon, mémoires de l'académie de chirurgie, in 2. tome 1. p. 317. et suite des obs. de M. Levret article 7. page 237.

** v. la dissertation de M. Crault insérée à la suite des accouchemens de M. Puyor.

Seroit rendue fistuleuse, parceque l'orifice de la matrice trop étroit
n'auroit point permis aux lochies de prendre la route du vagin; mais
on eut été bien de dommage de s'en peiner par l'honneur qui auroit
résulté d'un tel succès.

Ajoute encore de nouvelles, telle est par exemple la grosseur disproportionnée de la tête de l'enfant.
voici comme il s'explique à ce sujet au paragraphe XXIII: " Dans les cas où malgré la bonne
" conformation du bassin, la grosseur de la tête d'un enfant trop fort forme un obstacle à
" l'accouchement, si en même temps il y a des symptômes qui donnent lieu de craindre la
" rupture de la matrice, on ne peut compter sur un accouchement naturel, sans crime, ou
" au moins sans encourir le reproche d'ignorance. " en portant ce jugement, il paroit avoir
oublié ce qu'il a dit aux paragraphes VI et IX. Dans l'un il fait voir la difficulté qu'il
y a de se décider; dans l'autre il paroit douter que les causes rapportées au paragraphe VII.
Soient toujours capables de produire ce cruel accident. " quoiqu'il n'y ait, dit-il, aucune
" des causes dont nous venons de faire l'énumération qui ne soit capable de produire la
" rupture de matrice, il ne faut cependant pas conclure que leur présence soit toujours
" suivie de cet accident, on auroit la preuve du contraire dans les accouchements
" contre nature, où il existe toujours quelqu'un de ces causes, sans que la matrice
" se creve pour cela. " quelle incertitude? quels seroit donc les vrais signes qui
décideroient de l'absolute nécessité de l'opération? et puisqu'on ne peut compter sur aucun
de ceux que rapporte cet auteur il s'en suit par conséquent qu'il n'y en a point d'autres que ceux
admis par M. Simon et Ferré. M. Crantz est donc en contradiction avec lui-même
quand il ordonne l'opération césarienne sous des peines si mortifiantes dans le cas
où la seule grosseur de la tête seroit l'obstacle qui s'opposeroit à l'accouchement.
On ne peut guère juger de la grosseur de la tête d'un enfant que lorsqu'elle est descendue
dans le petit bassin, et alors on. Crantz rejette l'opération césarienne; avant qu'elle n'ait
fait ce trajet on ne touche qu'une partie de la tête avec l'extrémité du doigt qui
donne peu de lumières, et comme le détroit supérieur est toujours plus large que
l'inférieur quand il n'y a point de vice de conformation, la tête, toute grosse qu'elle soit,
s'il n'y a point d'hydrocéphale, descendra toujours dans le petit bassin, d'où l'on peut
l'extraire avec le forceps, et s'il y a hydrocéphale on peut faire la ponction, qui en
facilitant l'écoulement de l'eau contenue dans la tête, donnera la liberté aux os du crâne
de se croiser, et alors elle pourra franchir les détroits par les seuls efforts de la nature.

au paragraphe XXXVII. il paroit blâmer la pratique des chirurgiens français, qui après
avoir fait l'opération césarienne abandonnent la guérison de la plaie à la nature et font
sur le champ la gastrotomie; il dit que M. Keister trouve cette pratique étonnante.



la pratique des chirurgiens français n'est blâmable que d'un point; il font
bien d'abandonner la plaie de la matrice aux soins de la nature, ils feroient encore
au cas s'ils abandonnoient de même la plaie extérieure et s'ils se contentoient du
pansement le plus simple. Les points d'aiguille font de nouvelles incisions aux muscles
du bas ventre, aux légumes qui sont très sensibles, ils les traitent et par conséquent
doivent être dangereux *. Tous les viscéres du bas ventre et jusqu'aux légumes reçoivent
une grande quantité de nerfs, ils sont par cette raison susceptibles d'une grande irritation;
tous les moyens qui pourroient l'augmenter s'opposeroient à la guérison et produiroient des
accidens fâcheux. Voilà pourquoi si j'avois à faire l'opération césarienne je
surois de la cure tous les remèdes, stématiser et emplâtrer que cût. Prout
approuve, je laverois seulement la plaie avec une décoction légère de quelques
plantes vulnéraires; j'appliquerois des plumaceaux et des compresses, trempées
dans le même médicament, je les ferois souvent humecter en répandant la
décoction sur l'appareil pour l'empêcher de sécher. par ce moyen, la suppuration
s'établirait peu à peu, les lochies auroient la liberté de couler par la plaie si
elles prenoient cette route, elles y trouveroient un fluide qui seroit miscible avec elles
et qui ne s'opposeroit point à leur issue, elles passeroient à travers l'appareil.
ce n'est point l'art qui guérit les maladies, c'est la nature; l'art ne doit donc
qu'aider la nature quand celle-ci ne se suffit pas à elle-même.

* voyez le mémoire de M. Pibrac sur l'abus des suture, inséré dans les mémoires
de l'Académie Royale de Chirurgie, in 12. t. 9. p. 7.